


Vilniaus universitetas
Medicinos fakultetas



**STUDENTŲ
MOKSLINĖS VEIKLOS
LXXII
KONFERENCIJA**

Vilnius, 2020 m. gegužės 18–22 d.
PRANEŠIMŲ TEZĖS

*Leidinį sudarė VU MF Mokslo specialistė
dr. Simona KILDIENĖ*



VILNIAUS
UNIVERSITETO
LEIDYKLA

2020

Mokslo komitetas:

Prof. dr. (HP) Janina Tutkuvienė
Dr. Jurgita Stasiūnienė
Dr. Justinas Besusparis
Prof. dr. Nomeda Rima Valevičienė
Dr. Eglė Preikšaitienė
Dr. Diana Bužinskienė
Prof. dr. (HP) Saulius Vosylius
Dr. Saulius Galgauskas
Prof. dr. Eugenijus Lesinskas
Dr. Valdemaras Jotautas
Prof. habil. dr. (HP) Gintautas Brimas

Prof. dr. Marius Miglinas
Arnas Bakavičius
Dr. Kęstutis Trainavičius
Dr. Daiva Radzišauskienė
Dr. Rūta Gancevičienė
Dr. Violeta Kvedarienė
Prof. dr. (HP) Edvardas Danila
Dr. Kristina Ryliškienė
Dr. Gunaras Terbetas
Dr. Alvydas Navickas
Dr. Rima Viliūnienė
Prof. dr. Sigita Lesinskienė

Dr. Sigitas Ryliškis
Dr. Vytautas Tutkus
Dr. Sigita Burokienė
Dr. Agnė Abraitienė
Dr. Živilė Gudlevičienė
Dr. Viktorija Andrejevaitė
Dr. Arminas Skrebūnas
Prof. dr. Pranas Šerpytis
Dr. Robertas Samalavičius
Prof. dr. Vytautė Pečiulienė
Teresė Palšytė

Organizacinis komitetas:

Sofija Ekkert
Martinus Baltuonis
Agnė Macaitė
Eimantas Dumskis
Eglė Griškevičiūtė
Monika Blaževičiūtė
Ieva Kvietinskaitė
Eglė Balsienė
Nerijus Stukas
Ugnė Imbrasaitė
Vidas Petrauskas
Karolina Bagdonavičiūtė

Aurelija Liulytė
Joana Ščerbinkinaitė
Indrė Šemetaitė
Justė Petkevičiūtė
Gabija Rudzikaitė-Fergizė
Vaida Sudmantaitė
Mantas Jokubaitis
Martynas Račkauskas
Augusta Valentukevičiūtė
Jorigė Songailaitė
Greta Stonkutė
Rokas Bobina

Gratas Šepetyš
Justina Jankauskaitė
Greta Labul
Vilmantė Vaitekėnaitė
Milda Burneikaitė
Kipras Jauniškis
Paulina Zikaitė
Beatričė Raščiūtė
Milda Vitosytė
Rūta Malinauskaitė
Tomas Petras Vileikis

ISBN 978-609-07-0410-3 (skaitmeninis PDF)

© Tezių autoriai, 2020

© Vilniaus universitetas, 2020

PRIEŠMENSTRUACINIO SINDROMO (PMS) POŽYMIŲ SĄSAJŲ SU AMŽIUMI, IŠSILAVINIMU, PROFESINE PADĖTIMI IR SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMO PALYGINIMAS TARP VARTOJANČIŲ IR NEVARTOJANČIŲ ORALINĘ KONTRACEPCIJĄ (OK) MOTERŲ

Darbo autorės. Martyna SVEIKATAITĖ, Julija RUGELYTĖ, Gabija STULGYTĖ (III kursas).

Darbo vadovė. Prof. dr. Janina TUTKUVIENĖ (VU MF BMI Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra).

Tikslas. Išnagrinėti Lietuvos moterų patiriamų PMS simptomų stiprio sąsajas su amžiumi, išsilavinimu, profesine padėtimi bei socialinių tinklų naudojimo intensyvumu, palyginti vartojusių ir nevartojusių oralinius kontraceptikus moterų rezultatus.

Metodika. Anoniminė internetinė apklausa sudaryta 10 dažniausiai pasitaikantiems PMS simptomams įvertinti pagal Likert'o skalę (1 – niekada nepasireiškia, 5 – visada pasireiškia; kiekvienos moters visų simptomų įverčiai sumuoti, nustatytas požymių pasireiškimo vidurkis). 2019 m. apklausoje dalyvavo 10181 moteris, 81.3% (n = 8279) jų teigė patiriančios PMS. Tyrimo metu lyginti 15–25 metų oraliųjų kontraceptinių priemonių nevartojančių moterų PMS simptomai (n=5448) su tokio paties amžiaus jas vartojančių moterų rezultatais (n=624). PMS intensyvumas sietas su išsilavinimu, profesija ir socialinių tinklų naudojimo intensyvumu. Duomenys apdoroti MS Excel, IBM SPSS Statistics 24. Neparimetrinių duomenų palyginimui naudotas Kruskal-Wallis testas. P-reiškė <0.05 laikyta statistiškai reikšminga.

Rezultatai. Nevartojusių OK PMS stipris statistiškai reikšmingai skyrėsi tarp skirtingo išsilavinimo, profesinės padėties bei skirtingu intensyvumu naudojančių socialinius tinklus moterų, tuo tarpu tarp vartojusių OK statistiškai reikšmingas PMS skirtumas pastebėtas tik tarp amžiaus grupių ir socialinių tinklų naudojimo intensyvumo ($p<0,05$). Sunkiausias PMS simptomus tarp OK nevartojančių patyrė 15–20 metų merginos su aukštuoju išsilavinimu (3,74), besimokančios ir dirbančios tuo pat metu (3,71), naudojančios socialinius tinklus kiekvieną valandą (3,66), o tarp vartojančių: 21–25 metų turinčios pagrindinį išsilavinimą (3,95), 15–20 besimokančios mokykloje (3,7) ir naudojančios socialinius tinklus kartą per dieną (3,86). Lengviausius simptomus tarp nevartojusių OK patyrė 15–20 ir 21–25 metų moterys turinčios pagrindinį išsilavinimą (3,58), nedirbančios (3,46) ir naudojančios socialinius tinklus kartą per dieną (3,44), tarp vartojusių: 21–25 su aukštuoju išsilavinimu (3,35), 15–20 nedirbančios (3,44) ir abiejų amžiaus grupių naudojančios socialinius tinklus porą kartų per dieną (3,35).

Išvados. 1. Sunkiausias PMS simptomus patiria OK vartojančios 21–25 metų moterys, turinčios pagrindinį išsilavinimą. 2. Silpniausias PMS simptomus turėjo OK vartojančios 15–20 m. moterys, naudojančios socialinius tinklus porą kartų per dieną ir 21–25 m. moterys, turinčios aukštąjį išsilavinimą.

Raktažodžiai. Amžius; išsilavinimas; oraliniai kontraceptikai; PMS; profesija; socialiniai tinklai.