

11 lentelė. Salicilo rūgšties (SR) poveikis A3, *tw* ir be tipo mutantų šaknelių ilgiui cm, laboratorinėmis sąlygomis.

Patikimumo kriterijus (L_1) grupės viduje ir tarp grupių (L_2), lyginant su kontrole.

Koncentracija	Šaknelių ilgis, cm											
	L_1	$L_2/A3$ k0	L_1	L_2/tw_7 k0	L_1	L_2/tw_8 k0	L_1	L_2/tw_{11} k0	L_1	L_2/be_1 k0	L_1	L_2/be_2 K0
Be purškimo SR												
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,05	0,27	-	0,83	-	1,11	-	0,70	-	0,55	-	0,94	-
0,25	0,35	-	0,23	-	0	-	0,55	-	1,64	-	1,38	-
0,5	3,88	-	0,23	-	2,77	-	2,21	-	2,77	-	2,12	-
1	1,41	-	0,94	-	3,32	-	1,10	-	0,94	-	0,70	-
Po 1 purškimo SR												
0	-	8,13	-	4,47	-	7,42	-	2,82	-	4,16	-	4,43
0,05	2,12	6,01	1,17	3,29	2,21	8,04	0,22	2,01	1,10	2,59	1,66	5,18
0,25	0,70	8,83	5,05	0,94	2,12	5,30	3,18	6,01	3,53	8,04	0	4,43
0,5	1,06	7,07	0,83	4,43	3,18	4,24	2,12	4,94	1,66	4,94	1,66	5,18
1	0,55	6,93	2,49	2,77	2,77	3,05	1,38	3,60	1,94	5,18	2,12	6,10
Po 2 purškimų SR												
0	-	3,60	-	2,59	-	4,71	-	1,94	-	1,66	-	2,49
0,05	0,27	4,24	1,38	4,43	2,77	2,47	2,21	0,35	0,83	0,70	1,41	3,60
0,25	0	4,59	0,70	1,88	2,21	3,18	1,58	0,89	1,76	0,27	1,06	3,32
0,5	1,10	3,18	0,47	2,12	1,10	4,59	0	2,47	0,55	1,88	0,35	2,77
1	0,55	3,88	1,66	1,38	2,21	3,18	0,55	1,76	1,38	2,59	0,55	2,59
Po 3 purškimų SR												
0	-	7,76	-	3,38	-	4,43	-	6,10	-	4,94	-	6,37
0,05	3,06	4,16	2,77	5,18	0,70	5,26	2,20	2,45	2,35	2,59	1,34	3,40
0,25	1,71	3,34	4,24	6,65	0,85	3,89	1,20	2,78	2,00	2,20	2,23	2,60
0,5	4,71	2,21	1,94	4,47	0,47	4,99	0,23	5,82	0,20	4,00	0,22	4,40
1	0,47	7,21	1,67	0,51	0,70	5,26	0,70	5,26	1,00	3,20	0	4,60

