

# Связности в расслоениях полуголономных $r$ -реперов

Казимиерас НАВИШКИС (ВУ)

Пусть  $M$  – дифференцируемое многообразие класса  $C^\infty$ ,  $\bar{P}^r(M) \xrightarrow{\pi_0^r} M$  – соответствующее главное расслоение полуголономных  $r$  – реперов,  $\bar{L}_n^r$  – структурная группа расслоения  $\bar{P}^r(M)$ . Рассмотрим локальную систему координат  $(U^i)$  в окрестности  $U \subset M$ . Полуголономный репер  $X \in (\pi_0^r)^{-1}(U)$  определяется своими координатами  $(i, j, \alpha, \beta, \dots = 1, \dots, n)$ :

$$X = (u^i, u_{\alpha_1}^i, u_{\alpha_1 \alpha_2}^i, \dots, u_{\alpha_1 \dots \alpha_r}^i).$$

Любой элемент  $A \in \bar{L}_n^r$  может быть записан в виде

$$A = (A_{\beta_1}^\alpha, A_{\beta_1 \beta_2}^\alpha, \dots, A_{\beta_1 \dots \beta_r}^\alpha),$$

где  $\det \|A_{\beta}^\alpha\| \neq 0$ . Если

$$B = (B_{\beta_1}^\alpha, B_{\beta_1 \beta_2}^\alpha, \dots, B_{\beta_1 \dots \beta_r}^\alpha),$$

то

$$AB = C = (C_{\beta_1}^\alpha, C_{\beta_1 \beta_2}^\alpha, \dots, C_{\beta_1 \dots \beta_r}^\alpha),$$

где

$$C_{\beta_1 \dots \beta_a}^\alpha = \sum_{b=1}^a A_{\gamma_1 \dots \gamma_b}^\alpha B_{\beta_1 \dots \beta_a}^{\gamma_1 \dots \gamma_b} \quad (a = 1, \dots, r).$$

Для явного выражения величин  $B_{\alpha_1 \dots \alpha_a}^{\gamma_1 \dots \gamma_b}$  введем следующие понятия и обозначения. Пусть  $u = 1, \dots, b$  и  $a_1, \dots, a_b$  – такие положительные целые числа, что

$$a_1 + \dots + a_b = a.$$

Введем обозначение

$$S(u) = a_1 + \dots + a_u.$$

Тогда

$$S(1) = a_1, S(2) = a_1 + a_2, \dots, S(b) = a_1 + \dots + a_b.$$

Определим перестановку типа  $(a_1, \dots, a_u)$  как такую перестановку множества  $\{1, \dots, a\}$ , которая возрастает на каждом из множеств

$$\{S(u-1) + 1, \dots, S(u)\},$$

имеющих  $a_u$  элементов. Множество всех перестановок типа  $(a_1, \dots, a_u)$  обозначим через  $Sh(a_1, \dots, a_u)$ .

В этих обозначениях справедлива формула

$$B_{\beta_1 \dots \beta_a}^{\alpha_1 \dots \alpha_b} = \sum_{Sh(a_1, \dots, a_b)} B_{\beta_1 \dots \beta_{a_1}}^{\alpha_1} B_{\beta_{a_1+1} \dots \beta_{S(2)}}^{\alpha_2} \dots B_{\beta_{S(b-1)+1} \dots \beta_a}^{\alpha_b},$$

где суммирование в правой части производится по всем элементам множества  $Sh(a_1, \dots, a_b)$ , имеющего

$$\bar{s}(a, b) = \frac{1}{b} \sum_{t=0}^b (-1)^t C_b^t (b-t)^a$$

элементов (число  $\bar{s}(a, b)$  называется числом Стирлинга второго рода).

Координаты обратного элемента

$$A^{-1} = (A_{\beta_1}^{\alpha_1}, A_{\beta_1 \beta_2}^{\alpha_2}, \dots, A_{\beta_1 \dots \beta_r}^{\alpha_r})$$

к элементу  $A$  определяются из системы

$$\begin{aligned} A_{\gamma}^{\alpha} A_{\beta}^{\gamma} &= \delta_{\beta}^{\alpha}, \\ \sum_{b=1}^a A_{\gamma_1 \dots \gamma_b}^{\alpha} A_{\beta_1 \dots \beta_a}^{\gamma_1 \dots \gamma_b} &= 0 \quad (a = 2, \dots, r). \end{aligned}$$

На группе Ли  $\bar{L}_n^r$  определим инвариантные слева дифференциальные 1-формы

$$\theta = (\theta_{\beta_1}^{\alpha_1}, \theta_{\beta_1 \beta_2}^{\alpha_2}, \dots, \theta_{\beta_1 \dots \beta_r}^{\alpha_r})$$

равенствами

$$\theta_{\beta_1 \dots \beta_a}^{\alpha} = \sum_{b=1}^a A_{\gamma_1 \dots \gamma_b}^{\alpha} dA_{\beta_1 \dots \beta_a}^{\gamma_1 \dots \gamma_b}.$$

Чтобы записать 1-формы  $\theta$  в другом виде, применим способ обозначения, предложенный Г.Ф.Лаптевым в [1]. Пусть множество индексов  $\beta_{b+2}, \dots, \beta_a$  размещено в две ячейки, одна из которых может остаться и пустой. Порядок ячеек учитывается, а индексы в каждой ячейке пусть упорядочены по возрастанию их индексов. Произвольное такое размещение обозначим  $\{\Delta(a, b), \nabla(a, b)\}$ . Число таких размещений равно

$$\bar{s}(a-b, 1) + \bar{s}(a-b, 2) = 1 + (2^{a-b-1} - 1) = 2^{a-b-1}.$$

Пусть

$$A_{\beta_1 \dots \beta_b}^\gamma \in \nabla(a, b) \theta_{\beta_{b+1}}^\varepsilon \Delta(a, b)$$

обозначает сумму слагаемых, соответствующих всевозможным размещениям  $\{\Delta(a, b), \nabla(a, b)\}$ .

Пусть множество индексов  $\beta_{b+2}, \dots, \beta_a$  размещено в две одинаковые ячейки при условии, что ни одна из них не остается пустой. Порядок ячеек учитывается, а индексы в каждой ячейке пусть упорядочены по возрастанию их индексов. Произвольное такое размещение обозначим  $\{\bar{\Delta}(a, b), \bar{\nabla}(a, b)\}$ . Число таких размещений равно

$$\bar{s}(a-b, 2) = 2^{a-b-1} - 1.$$

Пусть

$$A_{\beta_1 \dots \beta_b}^\gamma \in \bar{\nabla}(a, b) \theta_{\beta_{b+1}}^\varepsilon \bar{\Delta}(a, b)$$

обозначает сумму всех слагаемых, соответствующих всевозможным размещениям  $\{\bar{\Delta}(a, b), \bar{\nabla}(a, b)\}$ .

Используя метод математической индукции, получаем, что 1-формы  $\theta$  можно записать в следующем виде:

$$\begin{aligned} \theta_{\beta_1 \dots \beta_a}^\alpha &= A_{\beta_1 \dots \beta_a}^{\alpha*} (dA_{\beta_1 \dots \beta_a}^\gamma - A_{\varepsilon \bar{\nabla}(a, 0)}^\gamma \theta_{\bar{\Delta}(a, 0)}^\varepsilon \\ &\quad - \sum_{b=1}^{a-1} A_{\beta_1 \dots \beta_b}^\gamma \in \nabla(a, b) \theta_{\beta_{b+1}}^\varepsilon \Delta(a, b)). \end{aligned}$$

Здесь в правой части имеется

$$1 + (2^{a-1} - 1) + \sum_{b=1}^{a-1} 2^{a-b-1} = 2^a - 1$$

слагаемых.

Дифференцируя внешним образом 1-формы  $\theta$ , получаем структурные уравнения полуголономной группы Ли  $\bar{L}_n^r$ :

$$D\theta_{\beta_1 \dots \beta_a}^\alpha = \theta_{\Delta(a,0)}^\gamma \wedge \theta_{\gamma \nabla(a,0)}^\alpha + \sum_{b=1}^{a-1} \theta_{\beta_{b+1} \Delta(a,b)}^\gamma \wedge \theta_{\beta_1 \dots \beta_b \gamma \nabla(a,b)}^\alpha;$$

здесь в правой части имеется

$$2^{a-1} + \sum_{b=1}^{a-1} 2^{a-b-1} = 2^a - 1$$

слагаемых. Другим способом структурные уравнения группы  $\bar{L}_n^r$  получены Ю.Г.Лумисте [2].

Отображение

$$ad(B^{-1}) : \bar{L}_n^r \ni A \longrightarrow ad(B^{-1})A = B^{-1}AB \in L_n^r$$

индуцирует отображение

$$Ad(B^{-1}) : \theta \longrightarrow Ad(B^{-1})\theta,$$

определяемое формулами

$$\begin{aligned} (Ad(b^{-1}))_{\beta_1 \dots \beta_a}^\alpha &= B_\gamma^* \left[ \sum_{b=1}^a B_{\beta_1 \dots \beta_a}^{\varepsilon_1 \dots \varepsilon_b} \theta_{\varepsilon_1 \dots \varepsilon_b}^\gamma - B_{\varepsilon \nabla(a,0)}^\gamma (Ad(B_{-1})\theta)_{\nabla(a,0)}^\varepsilon \right. \\ &\quad \left. - \sum_{b=1}^{a-1} B_{\beta_1 \dots \beta_b \varepsilon \nabla(a,b)}^\gamma (Ad(B^{-1})\theta)_{\beta_{b+1} \Delta(a,b)}^\varepsilon \right]; \end{aligned}$$

здесь в правой части имеется

$$a + (2^a - 1) + \sum_{b=1}^{a-1} 2^{a-b-1} = 2^a + a - 2$$

слагаемых.

На главном расслоении  $\bar{P}^r(M)$  глобально определены 1-формы

$$\omega = (\omega^\alpha, \omega_{\beta_1}^\alpha, \omega_{\beta_1 \beta_2}^\alpha, \dots, \omega_{\beta_1 \dots \beta_r}^\alpha).$$

В локальных координатах на  $\bar{P}^r(U)$  они определяются рекуррентным образом из формул

$$du^i = u_\alpha^i \omega^\alpha,$$

$$du_{\beta_1 \dots \beta_a}^i = u_{\beta \nabla(a,0)}^i \omega_{\nabla(a,0)}^\beta + \sum_{b=1}^{a-1} u_{\beta_1 \dots \beta_b \beta \nabla(a,b)}^i \omega_{\beta_{b+1} \Delta(a,b)}^\beta + u_{\beta_1 \dots \beta_a \beta}^i \omega^\beta \quad (a = 1, \dots, r);$$

здесь в правой части имеется

$$2^{a-1} + \sum_{b=1}^{a-1} 2^{a-b-1} + 1 = 2^a$$

слагаемых. Структурные уравнения 1-форм  $\omega$  имеют следующий вид:

$$\begin{aligned} D\omega^\alpha &= \omega^\beta \wedge \omega_\beta^\alpha + \frac{1}{2} T_{\beta\gamma}^\alpha \omega^\beta \wedge \omega^\gamma, \\ D\omega_{\beta_1 \dots \beta_a}^\alpha &= \omega_{\Delta(a,0)}^\gamma \wedge \omega_{\gamma \nabla(a,0)}^\alpha \\ &+ \sum_{b=1}^{a-1} \omega_{\beta_{b+1} \Delta(a,b)}^\gamma \wedge \omega_{\beta_1 \dots \beta_b \gamma \nabla(a,b)}^\alpha + \omega^\gamma \wedge \omega_{\beta_1 \dots \beta_a \gamma}^\alpha + \frac{1}{2} T_{\beta_1 \dots \beta_a \gamma \epsilon}^\alpha \omega^\gamma \wedge \omega^\epsilon; \end{aligned}$$

здесь в правой части имеется  $2^a + 1$  слагаемых; кроме того, величины  $T_{\beta_1 \beta_2, \dots}^\alpha$ ,  $T_{\beta_1 \dots \beta_a \gamma \epsilon}^\alpha$  определяются из рекуррентных соотношений

$$\begin{aligned} 2u_{\beta_1 \dots \beta_{a-1} [\beta_a \beta]}^i &= T_{\Delta(a-1,0) \beta_a \gamma}^\gamma u_{\gamma \nabla(a-1,0)}^i \\ &+ \sum_{b=1}^{a-2} T_{\beta_{b+1} \Delta(a-1,b) \beta_a \beta}^\gamma u_{\beta_1 \dots \beta_b \nabla(a-1,b)}^i + T_{\beta_a \beta}^\gamma u_{\beta_1 \dots \beta_{a-1} \gamma}^i; \end{aligned}$$

здесь в правой части имеется  $2^{a-1}$  слагаемых.

Действие группы Ли  $\bar{L}_n^r$  на главном расслоении  $\bar{P}^r(M)$  индуцирует гомоморфизм

$$\lambda : L(\bar{L}_n^r) \longrightarrow X(\bar{P}^r(M))$$

алгебры Ли  $L(\bar{L}_n^r)$  группы Ли  $\bar{L}_n^r$  в алгебру Ли  $X(\bar{P}^r(M))$  векторных полей на  $\bar{P}^r(M)$ .

Связностью на главном расслоении  $\bar{P}^r(M)$  назовем такую 1-форму  $\omega$ , которая обладает следующими свойствами:

- 1)  $R_a^* \omega = Ad(a^{-1}) \omega, \forall a \in \bar{L}_n^r$ ;
- 2)  $\omega(\lambda(A)) = A, \forall A \in L(\bar{L}_n^r)$ .

Связность на главном расслоении  $\bar{P}^r(M)$  определяется такими функциями (коэффициентами связности)

$$\Gamma_{j_1 \dots j_a}^i \quad (a = 2, \dots, r+1),$$

что

$$u_{\alpha_1 \dots \alpha_a \alpha_{a+1}}^i = \sum_{b=1}^a \Gamma_{j_1 \dots j_b j_{b+1}}^i u_{\alpha_1 \dots \alpha_a}^{j_1 \dots j_b} u_{\alpha_{a+1}}^{j_{b+1}}, \quad (a = 1, \dots, r).$$

## Литература

- [1] Г.Ф. Лаптев, Структурные уравнения главного расслоенного многообразия, *Тр. Геометр. семинара, Ин-т научн. информ. АН СССР*, **2**, 161–178 (1969).
- [2] Ю.Г. Лумисте, Матричное представление полуголономной дифференциальной группы и структурные уравнения расслоения  $r$ -коррепоров, *Тр. Геометр. семинара, Ин-т научн. информ. АН СССР*, **5**, 239–257 (1974).

## Connections in the semiholonomic frame bundle of order $r$

K. Navickis

In this article we define the canonical forms on the principal bundle of semiholonomic frames of order  $r$ , give structure equations for these forms and determine the connection of order  $r$ .