

# Hurwitz'o dzeta funkcijos aproksimavimas baigtine suma\*

Ramūnas GARUNKŠTIS

e-mail: ramunas.garunkstis@maf.vu.lt

Tegu  $s = \sigma + it$  yra kompleksinis kintamasis. Hurwitz'o dzeta funkcija  $\zeta(s, \alpha)$ , kai  $\sigma > 1$ , apibrėžiama Dirichlet eilute

$$\zeta(s, \alpha) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(m + \alpha)^s},$$

čia parametras  $0 < \alpha \leq 1$ . Ši funkcija analiziškai pratęsiamą į visą kompleksinę plokštinumą, išskyrus tašką  $s = 1$ , kuriame turi paprastą polių. Voronino ir Karacubos monografijoje ([3], 3.2 skyrius) (taip pat žr. [2], 3.1 skyrius) įrodyta, kad jei  $0 < \sigma_0 \leq \sigma \leq 2$  ir  $\pi x \geq |t| \geq 2\pi$ , tai

$$\zeta(s, \alpha) = \sum_{0 \leq n \leq x} \frac{1}{(n + \alpha)^s} + \frac{x^{1-s}}{s-1} + O(x^{-\sigma}),$$

kur konstanta ženkle  $O$  priklauso tik nuo  $\sigma_0$ . Mūsų tikslas parodyti, kad pastaroji formulė galioja visame intervale  $0 \leq \sigma \leq 2$  ir suskaičiuoti konstantą ženkle  $O$ .

Apibrėžkime žymėjimą  $\Theta(\alpha)$ , reiškiantį tam tikrą kompleksinį skaičių, modulių nedidesnį negu  $|\alpha|$ . Pavyzdžiui,  $f(s) = \Theta(g(s))$ , kai  $\sigma_1 \leq \sigma \leq \sigma_2$  reiškia kad  $|f(s)| \leq |g(s)|$  juostoje nuo  $\sigma_1$  iki  $\sigma_2$ .

**Theorem.** Tegu  $\sigma \geq 0$  ir  $|t| \leq \pi x$ . Tuomet

$$\zeta(s, \alpha) = \sum_{0 \leq n \leq x} \frac{1}{(n + \alpha)^s} + \frac{(x + \alpha)^{1-s}}{s-1} + \Theta\left(\frac{7\sqrt{2}\pi^{-1} + 3}{x^\sigma}\right).$$

Teoremos įrodymui bus naudinga tolimesnė lema.

**Lemma.** Tegu  $f(x)$  yra reali intervale  $[a, b]$  funkcija. Tegu  $f'(x)$  yra tolydi ir monotoniška intervale  $[a, b]$  bei  $|f'(x)| \leq \delta < 1$ . Tuomet

$$\sum_{a < n \leq b} e(f(n)) = \int_a^b e(f(x)) dx + \Theta\left(\frac{4\sqrt{2}\delta}{\pi(1-\delta)} + \frac{6\sqrt{2}\delta}{\pi} + 3\right).$$

---

\*Darbas remiamas Lietuvos mokslo ir studijų fondo

Čia  $e(x) = e^{2\pi ix}$ .

*Įrodymas.* Tai gerai žinomas klasikinis teiginys. Tokiu pavidalu, kaip suformuluota čia, įrodymą galima rasti straipsnyje [1].

*Teoremos įrodymas.* Kai  $\sigma \geq \sigma_0 > 0$  tai (Voronin ir Karacuba [3], 1.4 skyrius, Lema 3),

$$\zeta(s, \alpha) = \sum_{n=0}^N \frac{1}{(n + \alpha)^s} + \frac{1}{s-1} \left( N + \frac{1}{2} + \alpha \right)^{1-s} + s \int_{N+1/2}^{\infty} \frac{1/2 - \{u\}}{(u + \alpha)^{s+1}} du.$$

Šioje lygybėje paskutinis dėmuo savo absoliučiu dydžiu yra nedidesnis už  $\frac{|s|}{\sigma_0} N^{-\sigma_0}$ . Apibrezkime

$$A(u) = \sum_{x < n \leq u} (n + \alpha)^{-it}.$$

Taikome Lemą, kai  $f(x) = (2\pi)^{-1} t \log(x + \alpha)$ ,  $\delta = \frac{1}{2}$  ir  $x \geq |t|/\pi$ . Tuomet

$$A(u) = \frac{(u + \alpha)^{1-it} - (x + \alpha)^{1-it}}{1 - it} + \Theta \left( \frac{7\sqrt{2}}{\pi} + 3 \right).$$

Kai  $x \leq N$ , sumuodami dalimis, gauname

$$\begin{aligned} \sum_{x < n \leq N+1/2} (n + \alpha)^{-s} &= \sigma \int_x^{N+1/2} \frac{A(u) du}{(u + \alpha)^{\sigma+1}} + \frac{A(N + 1/2)}{(N + 1/2 + \alpha)^\sigma} \\ &= \frac{(N + 1/2 + \alpha)^{1-s}}{1-s} - \frac{(x + \alpha)^{1-s}}{1-s} \\ &\quad + \Theta \left( \frac{7\sqrt{2}\pi^{-1} + 3}{x^\sigma} \right) + O \left( \frac{x}{N^\sigma} \right), \quad N \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Iš šios ir (1) lygybių, paleidę  $N$  į begalybę, gauname teoremos tvirtinimą atveju  $\sigma \geq \sigma_0 > 0$ . Kadangi  $\sigma_0$  galime pasirinkti kaip norima mažą, o paklaidos narys išlieka aprėžtas  $\sigma_0$  artėjant prie 0 ir kadangi funkcija  $\zeta(s, \alpha)$  yra tolydi nagrinėjamoje srityje, tai teoremos tvirtinimas išlieka teisingas visiem  $\sigma \geq 0$ . Tuo teorema įrodyta.

## References

- [1] R. Garunkštis, The effective universality theorem for the Riemann zeta function, *Proceedings of the Session "Analytic Number Theory and Diophantine Equations"*, Max-Planck-Institut fuer Mathematik (to appear).

[2] R. Garunkštis, A. Laurinčikas, *The Lerch Zeta-Function*, Kluwer Academic Publishers (2002).

[3] A.A. Karatsuba, S.M. Voronin, *The Riemann Zeta-Function*, De Gruyter Expositions in Mathematics, **5**, Berlin (1992).

## An approximation of the Hurwitz zeta function by a finite sum

R. Garunkštis

We obtain the following version of the approximation of the Hurwitz zeta-function. Let  $\sigma \geq 0$  and  $|t| \leq \pi x$ . Then

$$\zeta(s, \alpha) = \sum_{0 \leq n \leq x} \frac{1}{(n + \alpha)^s} + \frac{(x + \alpha)^{1-s}}{s - 1} + \Theta \left( \frac{7\sqrt{2}\pi^{-1} + 3}{x^\sigma} \right).$$