

## Daugiamačių skaičiuojančių procesų didžiųjų skaičių dėsnis

Vaidotas KANIŠAUSKAS (ŠU)

el. paštas: mat.kat@fm.su.lt

Tarkime, kad

$$N_t(x_1, \dots, x_d) = \sum_{n=1}^{\infty} 1(T_n^1 \leq x_1 t, \dots, T_n^d \leq x_d t), \quad (1)$$

kur  $1(A)$  yra aibės  $A$  indikatorius,  $x_i > 0$ ,  $t \geq 0$ , yra daugiamatis skaičiuojantis procesas, apibrėžtas stochastinėje bazėje  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{F}, P)$  su  $T_n = (T_n^1, \dots, T_n^d)$  – seka atsitiktinių vektorių, turinčių nepriklausomas ir nemažėjančias komponentes, tenkinančias tokias asimptotines Kramerio sąlygas:

A: Egzistuoja teigiami skaičiai  $\beta_1, \dots, \beta_d$  ir diferencijuojamos funkcijos  $\psi_{\beta_i}^i(\lambda)$ ,  $\lambda \in \mathbb{R} = (-\infty; +\infty)$  tokie, kad

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1} \ln \mathbb{E} \exp\{\lambda n^{1-\beta_i} T_n^i\} = \psi_{\beta_i}^i(\lambda) < \infty,$$

$i = 1, \dots, d$ , o  $\mathbb{E}$  – žymi matematinį vidurkį.

Darbe nagrinėsime normuoto proceso  $t^{-\frac{1}{\gamma}} N_t(x_1, \dots, x_d)$  asimptotinę elgesį, kai  $t \rightarrow \infty$  ir  $\gamma > 0$ . Autoriaus žiniomis, tokio normuoto atsitiktinio proceso asimptotinis elgesys buvo nagrinėjamas taikant normavimą  $t^{-1}$  paprasčiausiu atveju, kai  $T_n^i = \sum_{j=1}^n X_j^i$ ,  $\mathbb{E} X_1^i = a_i < \infty$ , o  $X_1^i, \dots, X_n^i$ ,  $i = 1, \dots, d$ , yra nepriklausomi ir vieno-  
dai pasiskirtę atsitiktiniai dydžiai. Darbe [1] parodyta, kad tuo atveju teisinga tokia asimptotinė formulė

$$\lim_{n \rightarrow \infty} t^{-1} \mathbb{E} N_t(x_1, \dots, x_d) = \min_{j \in \{1, \dots, d\}} \frac{x_j}{a_j}.$$

Taip pat apibrėšime vienmačius procesus

$$N_i(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 1(T_n^i \leq t), \quad t \geq 0,$$

laikydami, kad  $N_i(\infty) = \infty$ ,  $i = 1, \dots, d$ .

Pasinaudosime lema.

LEMA [2]. Jei patenkinta A sąlyga, tai  $P - b.v.$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-\beta_i} T_n^i = a_i = (\psi_{\beta_i}^i(x))' \Big|_{x=0}, \quad (2)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{N_i(t)^{\beta_i}} = a_i. \quad (3)$$

Pagrindinis darbo rezultatas yra toks:

TEOREMA. Tarkime, kad patenkinta A sąlyga. Tada  $P - b.v.$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} t^{-\frac{1}{\beta}} N_t(x_1, \dots, x_d) = B,$$

kai

$$B = \begin{cases} \min_{j \in \{1, \dots, d\}} \left( \frac{x_j}{a_j} \right)^{\frac{1}{\beta}}, & \text{kai } \beta = \beta_1 = \dots = \beta_d, \\ \min_{j \in \{i_1, \dots, i_k\}} \left( \frac{x_j}{a_j} \right)^{\frac{1}{\beta}}, & \text{kai } \beta = \beta_{i_1} = \dots = \beta_{i_k} > \beta_j, \quad k \geq 1, \quad i_1, \dots, i_k, j \in \{1, \dots, d\}, \\ 0, & \text{kai } \beta = \beta_i < \beta_j, \quad i \neq j, \quad i, j \in \{1, \dots, d\}. \end{cases}$$

Irodymas. Akivaizdu, kad

$$N_t(x_1, \dots, x_d) \leq \min_{j \in \{1, \dots, d\}} N_j(tx_j). \quad (4)$$

Remiantis lema  $P - b.v.$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{N_j(x)}{x^{\frac{1}{\beta_j}}} = \left( \frac{1}{a_j} \right)^{\frac{1}{\beta_j}}, \quad j = 1, \dots, d.$$

Vadinasi,  $P - b.v.$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N_j(tx_j)}{t^{\frac{1}{\beta_j}}} = \left( \frac{x_j}{a_j} \right)^{\frac{1}{\beta_j}}, \quad j = 1, \dots, d. \quad (5)$$

Kai  $\beta_i > \beta_j$ ,  $P - b.v.$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t^{\frac{1}{\beta_j}}} N_j(tx_j) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^\alpha}{t^{\frac{1}{\beta_j}}} N_j(tx_j) = 0, \quad (6)$$

kur  $\alpha > 0$ .

Kai  $\beta_i < \beta_j$ ,  $P - b.v.$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t^{\frac{1}{\beta_i}}} N_j(tx_j) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t^\gamma t^{\frac{1}{\beta_j}}} N_j(tx_j) = 0, \quad (7)$$

kur  $\gamma > 0$ .

Iš (4)–(7) gauname

$$\lim_{t \rightarrow \infty} t^{-\frac{1}{\beta}} N_t(x_1, \dots, x_d) \leq \min \left( \lim_{t \rightarrow \infty} t^{-\frac{1}{\beta}} N_1(tx_1), \dots, \lim_{t \rightarrow \infty} t^{-\frac{1}{\beta}} N_d(tx_d) \right) = B. \quad (8)$$

Irodysime nelygybę į kitą pusę. Tuo tikslu apibrėžiame procesą

$$N_{t,v}(x_1, \dots, x_d) = \sum_{n=1}^{\infty} 1 \left( \frac{T_n^1}{x_1} \vee \frac{T_n^2}{x_2} \vee \dots \vee \frac{T_n^d}{x_d} \leq t \right),$$

kur  $a \vee b = \max(a, b)$ .

Bet kuriam skaičiuojančiam procesui  $N(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 1(T_n \leq t)$ , jei  $P$  – b.v.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_n}{n^\beta} = a,$$

tai  $P$  – b.v.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N(t)}{t^{\frac{1}{\beta}}} = \left( \frac{1}{a} \right)^{\frac{1}{\beta}},$$

nes galioja nelygybė

$$T_{N(t)-1} \leq t < T_{N(t)+1} \quad \text{ir} \quad N(\infty) = \infty.$$

Tegu  $T_n = T_n^1 \vee T_n^2 \vee \dots \vee T_n^d$  ir  $T_n^1, \dots, T_n^d$  tenkina A sąlygą, tada

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{T_n^1}{n^\beta} \vee \frac{T_n^2}{n^\beta} \vee \dots \vee \frac{T_n^d}{n^\beta} \right) \\ &= \begin{cases} a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_d, & \text{jei } \beta = \beta_1 = \dots = \beta_d, \\ a_{i_1} \vee \dots \vee a_{i_k}, & \text{jei } \beta = \beta_{i_1} = \dots = \beta_{i_k} > \beta_j, \quad k \geq 1, \quad i_1, \dots, i_k, j \in \{1, \dots, d\}, \\ \infty, & \text{jei } \beta = \beta_i < \beta_j, \quad i \neq j, \quad i, j \in \{1, \dots, d\}. \end{cases} \end{aligned}$$

Kai

$$N(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 1 \left( T_n^1 \vee T_n^2 \vee \dots \vee T_n^d \leq t \right),$$

gauname, kad  $P$  – b.v.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N(t)}{t^{\frac{1}{\beta}}} = \begin{cases} \min_{i \in \{1, \dots, d\}} \frac{1}{a_i^{\beta_i}}, & \text{jei } \beta = \beta_1 = \dots = \beta_d, \\ \min_{r \in \{i_1, \dots, i_k\}} \left( \frac{1}{a_r} \right)^{\frac{1}{\beta}}, & \text{jei } \beta = \beta_{i_1} = \dots = \beta_{i_k} > \beta_j, \quad k \geq 1, \\ & i_1, \dots, i_k, j \in \{1, \dots, d\}, \\ 0, & \text{jei } \beta = \beta_i < \beta_j, \quad i \neq j, \quad j \neq \emptyset. \end{cases}$$

Analogiškai gauname, kad

$$\lim_{t \rightarrow \infty} t^{-\frac{1}{\beta}} N_{t,v}(x_1, \dots, x_d) = B.$$

Kadangi

$$N_t(x_1, \dots, x_d) \geq N_{t,v}(x_1, \dots, x_d),$$

tai

$$\lim_{t \rightarrow \infty} t^{-\frac{1}{\beta}} N_t(x_1, \dots, x_d) \geq B. \quad (9)$$

Sujungę (8) su (9) gauname teoremos rezultata. Teorema įrodyta.

**Išvada.** Tarkime, kad turime teigiamų nepriklausomų ir vienodai pasiskirsčiusių atsitiktinių dydžių seką  $\{X_n^j, n \geq 1\}$ , tenkinančią Kramerio sąlygą:

$$\mathbb{E}e^{\lambda X_1^j} < \infty, \quad \lambda > 0, \quad j = 1, \dots, d.$$

Tada daugiamačiui išplėstiniui atstatymo procesui

$$N_{t,\beta_1,\dots,\beta_d}(x_1, \dots, x_d) = \sum_{n=1}^{\infty} 1(n^{\beta_1-1} S_n^1 \leq x_1 t, \dots, n^{\beta_d-1} S_n^d \leq x_d t), \quad t \geq 0, \quad x_i > 0,$$

kai  $S_n^j = \sum_{i=1}^n X_i^j$ ,  $\beta_j \in (0, 1)$  galioja teoremos rezultatas.

### References

1. I.S. Molchanov, E. Omey, E. Kozarovitzky, An elementary renewal theorem for random compact convex sets, *Adv. Appl. Prob. (SGSA)*, **27**, 931–942 (1995).
2. V. Kanišauskas, Large deviations for counting processes, *Liet. matem. rink.*, **40**(spec. nr.), 287–289 (2000).

### SUMMARY

#### **V. Kanišauskas. The law of the large numbers for multivariate counting processes**

In this paper we consider the law of large numbers for multivariate counting processes when the extended conditions of Cramers is satisfied.

*Keywords:* counting process, Cramer's condition.