

## Apie naujus Ramachandran–Rao charakterizacijos stabilumo įverčius

Romanas JANUŠKEVIČIUS (VPU), Olga JANUŠKEVIČIENĖ\* (VPU, MII)

el. paštas: romjan@vpu.lt

**Reziumė.** Yra žinoma, kad jei  $X, X_1, X_2, \dots, X_n$  yra nepriklausomi vienodai pasiskirstę atsitiktiniai dydžiai ir prie tam tikrų sąlygų empirinio vidurkio  $\bar{X} = \bar{X}(n) = (X_1 + \dots + X_n)/n$  ir monomo  $X$  skirstiniai sutampa, tai atsitiktiniai dydžiai  $X, X_1, X_2, \dots, X_n$  turi Koši skirstinį. Darbe išnagrinėtas šios charakterizacijos stabilumo įvertis.

*Raktiniai žodžiai:* charakterizacija, stabilumo įverčiai, Koši skirstinys.

B. Ramachandran ir C.R. Rao [1] įrodė, kad jei  $X, X_1, X_2, \dots, X_n$  yra nepriklausomi vienodai pasiskirstę atsitiktiniai dydžiai, o empirinio vidurkio  $\bar{X} = \bar{X}(n) = (X_1 + \dots + X_n)/n$  ir monomo  $X$  skirstiniai sutampa bent dviem kintamojo  $n$  reikšmėms  $n = j_1$  ir  $n = j_2$  tokioms, kad santykis  $\log j_1 / \log j_2$  yra iracionalus, tai atsitiktiniai dydžiai  $X, X_1, X_2, \dots, X_n$  turi Koši skirstinį.

Darbe [2] įrodyta, kad jei paminėti statistikų  $\bar{X}(n)$  ir  $X$  skirstiniai bent dviem  $n$  reikšmėms  $n = j_1$  ir  $n = j_2$  sutampa ne tiksliai, bet su paklaida  $\varepsilon$ , tai atsitiktinių dydžių  $X, X_1, \dots, X_n$  skirstiniai yra artimi  $\lambda$ -metrikos prasme Koši skirstiniui.

Darbe [2] gauta, kad paminėtas artumas yra laipsninės eilės, tačiau pats stabilumo laipsnis nebuvo įvertintas. Mūsų darbo tikslas – įvertinti šį laipsnį, t.y. gauti Ramachandran–Rao charakterizacijos [1] stabilumo įvertį  $\lambda$ -metrikoje.

Tuo tikslu priminsime  $\lambda$ -metrikos apibrėžimą:

$$\lambda(U, V) = \min_{T>0} \max \left\{ \frac{1}{2} \max_{|t| \leq T} |f_U(t) - f_V(t)|, \frac{1}{T} \right\},$$

kur  $f_U(t)$  ir  $f_V(t)$  yra atitinkamai atsitiktinių dydžių  $U$  ir  $V$  charakteristinės funkcijos.

**TEOREMA.** *Tarkime, kad  $X, X_1, \dots, X_{j_1}, \dots, X_{j_2}$  yra nepriklausomi atsitiktiniai dydžiai, o  $j_1$  ir  $j_2$  yra natūralieji skaičiai, kurių logaritmų santykis  $\log j_1 / \log j_2$  ( $2 \leq j_1 < j_2$ ) yra iracionalus. Tarkime, be to, kad empiriniai vidurkiai  $\bar{X}(j_1)$  ir  $\bar{X}(j_2)$  beveik sutampa su  $X$  šia prasme:*

$$\lambda(X, \bar{X}(j_1)) \leq \varepsilon, \quad \lambda(X, \bar{X}(j_2)) \leq \varepsilon. \quad (1)$$

\* Autorės darbą parėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, projekto registracijos Nr. T-15/07

Jei, be to, egzistuoja realus  $z_* \neq 0$  toks, kad

$$\operatorname{Im} \log E \exp(i z_* X) = 0, \quad (2)$$

tai egzistuoja atsitiktinis dydis  $X$ , turintis Koši skirstinį, ir konstanta  $C > 0$  tokia, kad bet kuriam  $i$

$$\lambda(X_i, Y) \leq C \varepsilon^{1/(1+36821 \log j_1 j_2)}. \quad (3)$$

*Irodymas.* Iš autorių darbo [2] gauname, kad jei  $f(z)$  – atsitiktinio dydžio  $X$  charakteristinė funkcija, tai

$$\left| f(z) - \exp \left\{ -|\Lambda_\theta| \exp(i D_\theta \operatorname{sign} z) |z| (\theta \varkappa)^{-1} \right\} \right| \leq C_1 (\varepsilon + \varepsilon^\Delta), \quad |z| \leq 1/\varepsilon, \quad (4)$$

kur

$$\begin{aligned} \Lambda_\theta &= j_1 \log f(\theta \varkappa / j_1), \\ D_\theta &= \arctan(\operatorname{Im} \Lambda_\theta / \operatorname{Re} \Lambda_\theta), \\ \theta &= \inf \{ |u| : |f(u \varkappa)| = 1/2 \}, \end{aligned}$$

o  $\varkappa$  yra apibrėžiamas žemiau,  $\Delta$  – teigiama konstanta.

Parinkime dabar  $\varkappa$  taip, kad

$$\theta \varkappa / j_1 = \varkappa. \quad (5)$$

Iš (2) ir (5) gauname, kad  $\operatorname{Im} \Lambda_\theta = 0$ . O tai reiškia, kad

$$D_\theta = \arctan(\operatorname{Im} \Lambda_\theta / \operatorname{Re} \Lambda_\theta) = 0. \quad (6)$$

Konstantą  $\Delta$  formulėje (4) galima įvertinti diofantinių aproksimacijų metodu. Yra žinoma, kad egzistuoja konstantos  $\delta_1 = \delta_1(j_1, j_2)$  ir  $\delta_2 = \delta_2(j_1, j_2)$  tokios, kad bet kuriems natūraliesiems skaičiams  $r$  ir  $k$  ir bet kuriems natūraliesiems skaičiams  $j_1$  ir  $j_2$  su iracionaliuoju santykiu  $\log j_1 / \log j_2$  yra teisinga tokia nelygybė:

$$|r \log j_1 - k \log j_2|^\alpha > \delta_2 r^{-\delta_1}. \quad (7)$$

Formulėje (7) konstantas  $\delta_1$  ir  $\delta_2$  N. Gouillon darbo [3] pagrindu galima parinkti taip:

$$\delta_1 = 36821 \log j_1 \log j_2, \quad \delta_2 = 23^{36821 \log j_1 \log j_2}. \quad (8)$$

Yra žinoma, kad stabilijų skirstinių klasę sudaro aibė skirstinių, priklausančių nuo keturių parametru  $\alpha \in (0, 2]$ ,  $\beta \in [-1, 1]$ ,  $\gamma \in (-\infty; +\infty)$ ,  $\lambda \in (0; +\infty)$ . Stabiliojo skirstinio charakteristinę funkciją  $y(t)$  galima užrašyti taip:

$$\log y(t) = i t \gamma - \lambda |t|^\alpha \omega(t, \alpha, \beta), \quad (9)$$

kur

$$\begin{aligned} \omega(t, \alpha, \beta) &= \begin{cases} \exp(i \frac{\pi}{2} \beta K(\alpha) \operatorname{sign} t), & \text{kai } \alpha \neq 1, \\ 1 + i \beta \frac{2}{\pi} \log |t| \operatorname{sign} t, & \text{kai } \alpha = 1, \end{cases} \\ K(\alpha) &= 1 - |1 - \alpha| = \min(\alpha, 2 - \alpha). \end{aligned}$$

Formulėje (9) paėmę  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 0$ ,  $\gamma = 0$ ,  $\lambda = |\Lambda_\theta|(\theta x)^{-1} = |\Lambda_\theta|/(j_1 x)$ , iš sąryšių (1), (8) ir (9) bei autorių teoremos [2] gauname (3).

Teorema įrodyta.

### Literatūra

1. B. Ramachandran, C.R. Rao, Solutions of functional equations arising in some regression problems and a characterization of the Cauchy law, *Sankhyā*, ser. A, **32** (1), 1–30 (1970).
2. R. Januškevičius, O. Januškevičienė, Apie stabilumo įverčius be simetriškumo sąlygos, *Liet. mat. rink.*, **46**(spec. nr.), 439–441 (2006).
3. N. Gouillon, Explicit lower bounds for linear forms in two logarithms, *Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux*, **18**(1), 125–146 (2006).

### SUMMARY

**R. Januškevičius, O. Januškevičienė. On new stability estimations in Ramachandran–Rao characterization**

B. Ramachandran and C.R. Rao have proved that if  $X, X_1, X_2, \dots, X_n$  are i.i.d. random variables and if distributions of sample mean  $\bar{X} = \bar{X}(n) = (X_1 + \dots + X_n)/n$  and monomial  $X$  are coincident at least at two points  $n = j_1$  and  $n = j_2$  such that  $\log j_1 / \log j_2$  is irrational, then  $X$  follows a Cauchy law. Assuming that condition of coincidence of  $\bar{X}(n)$  and  $X$  are fulfilled at least for two  $n$  values, but only approximately, with some error  $\varepsilon$  in metric  $\lambda$ , we prove that, in certain sense, characteristic function of  $X$  is close to the characteristic function of the Cauchy distribution and construct stability estimation.

*Keywords:* Cauchy distribution, sample mean, identically distributed statistics, stability estimations.