




**STUDENTŲ  
MOKSLINĖS VEIKLOS  
LXXII  
KONFERENCIJA**

**2020  
VILNIUS**






**STUDENTŲ  
MOKSLINĖS VEIKLOS**  
*LXXII*  
**KONFERENCIJA**

Vilnius, 2020 m. gegužės 18–22 d.

**PRANEŠIMŲ TEZĖS**



Vilniaus universitetas  
Medicinos fakultetas

A decorative graphic consisting of several triangles: a solid black triangle pointing up at the top center, a solid grey triangle pointing down below it, and two solid grey triangles pointing up, one on the left and one on the right, positioned below the main title.

**STUDENTŲ  
MOKSLINĖS VEIKLOS  
LXXII  
KONFERENCIJA**

Vilnius, 2020 m. gegužės 18–22 d.  
**PRANEŠIMŲ TEZĖS**

*Leidinį sudarė VU MF Mokslo specialistė  
dr. Simona KILDIENĖ*



VILNIAUS  
UNIVERSITETO  
LEIDYKLA

2020

## ANTIPSICHOTIKŲ IR/AR ANTIDEPRESANTŲ ĮTAKA SEKSUALINĖS DISFUNKCIJOS MASTUI IR ANAMNEZĖS RINKIMO SUNKUMAI, AIŠKINANTIS LYTINĖS FUNKCIJOS SUTRIKIMĄ

**Darbo autorius.** Jonas ŽALIMAS (VI kursas).

**Darbo vadovas.** Lekt. Laurynas BUKELSKIS, VU MF Psichiatrijos klinika.

**Darbo tikslas.** Nustatyti kiek pacientų ir kuriai lyčiai, vartojant antidepresantus ir/ar antipsichotikus pasireiškė lytinė disfunkcija ir nurodyti jos tipus. Įvertinti, kokie vaistai dažniau lėmė lytinės funkcijos sutrikimo pasireiškimą bei nustatyti ar gydytojas klausinėjo pacientų apie psichiką veikiančių vaistų, sukeltą seksualinę disfunkciją.

**Darbo metodika.** 2020 m. sausio–kovo mėn. atlikta anoniminė anketinė apklausa Klaipėdos Respublikinės ligoninės Psichiatrijos filialo skyriuose. Šiam tyrimui parengtos anketos, kurios buvo sudarytos iš klausimų apie seksualinio funkcionavimo pokyčius (angl. CSFQ) ir gydytojo komunikacija su pacientu lytinės disfunkcijos klausimais. Apklausų metu buvo išdalinta 200 anketų, tačiau tyrimui tinkančios buvo 166 anketos. Statistinė duomenų analizė buvo atlikta pasitelkus R Commander programą, bei SPSS programos 22 versiją.

**Rezultatai.** Įvertinus tiriamųjų atsakymus lytinė disfunkcija buvo nustatyta 72,7 proc. vyrų (95 proc. PI 68,8 ; 87,8) ir 75,9 proc. moterų (95 proc. PI 62,2 ; 81,7). Dažniausia seksualinė disfunkcija vyrams – seksualinio malonumo sutrikimas (90.9%), o moterims seksualinio susijaudinimo sutrikimas (90.4%). Tyrimo metu vertinta, kokie vaistai dažniau lėmė lytinių disfunkcijų pasireiškimą. Nustatyta, jog moterims, dažniau nei vyrams lėmė antidepresantų vartojimas, o vyrams, lytines disfunkcijas dažniau lėmė kombinuotas antipsichotikų ir antidepresantų poveikis. Vertinant gydytojo teiravimąsi apie paciento galimą seksualinę disfunkciją, tyrimo rezultatai nurodė, jog 32.8 proc. (95 % Pi 27 : 39) pacientų atsakė, jog juos konsultuojantis gydytojas klausinėjo apie lytinę disfunkciją, o paklausti nebuvo, buvo 67.2 proc. (95 % Pi 61 : 73).

**Išvados.** Apibendrinant, lytinės funkcijos sutrikimai pasireiškė 74.3 proc. respondentų ir vyravo labiau moteriškai lyčiai. Vartojant psichotropinius vaistus, būdingiausios seksualinės disfunkcijos – erekcijos bei susijaudinimo sutrikimai. Moterims seksualines disfunkcijas labiausiai pasireiškė vartojant antidepresantus, o vyrams lytinės disfunkcijas dažniau sukėlė kartu vartojami antidepresantai su neuroleptikais. Bei vertinant gydytojo ir paciento komunikaciją, lytinės funkcijos klausimais, išsiaiškinta, kad tik maža dalis pacientų buvo klausinėjami gydytojų apie lytinę disfunkciją.

**Raktažodžiai.** Seksualinė disfunkcija; antidepresantai; antipsichotikai.