




**STUDENTŲ
MOKSLINĖS VEIKLOS
LXXII
KONFERENCIJA**

**2020
VILNIUS**






**STUDENTŲ
MOKSLINĖS VEIKLOS**
LXXII
KONFERENCIJA

Vilnius, 2020 m. gegužės 18–22 d.

PRANEŠIMŲ TEZĖS



Vilniaus universitetas
Medicinos fakultetas

A decorative graphic consisting of several triangles: a solid black triangle pointing up at the top center, a solid grey triangle pointing down below it, and two solid grey triangles pointing up, one on the left and one on the right, positioned below the main title.

**STUDENTŲ
MOKSLINĖS VEIKLOS
LXXII
KONFERENCIJA**

Vilnius, 2020 m. gegužės 18–22 d.
PRANEŠIMŲ TEZĖS

*Leidinį sudarė VU MF Mokslo specialistė
dr. Simona KILDIENĖ*



VILNIAUS
UNIVERSITETO
LEIDYKLA

2020

RŪKANČIŲ IR NERŪKANČIŲ ŠEIMOS GYDYTOJŲ POŽIŪRIS Į ELEKTRONINES CIGARETES IR KAITINAMĄJĄ TABAKĄ

Darbo autorė. Ernesta PRANSKAITYTĖ (VI kursas).

Darbo vadovė. Dr. Viktorija ANDREJEVAITĖ, Vilniaus Universiteto Medicinos Fakultetas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika.

Darbo tikslas. Elektroninės cigaretės ir kaitinamojo tabako produktai – neseniai rinkoje atsiradusios priemonės, sparčiai populiarėjančios tarp jaunų suaugusiųjų. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti šeimos gydytojų požiūrį į naujųjų tabako gaminių keliamą riziką bei palyginti požiūrio skirtumus tarp rūkančių ir nerūkančių gydytojų. **Darbo metodika.** Šeimos gydytojų ir rezidentų (n=212) buvo paprašyta užpildyti anoniminį klausimyną. Respondentai turėjo atsakyti į klausimus, susijusius su jų žiniomis bei įsitikinimais apie elektronines cigaretes bei kaitinamąjį tabaką. Požymių pasitaikymo dažnumo skirtumų statistiniam reikšmingumui įvertinti buvo naudojamas Fišerio (Fisher) tikslusis kriterijus, laikoma, kad skirtumas statistiškai reikšmingas kai $p < 0,05$.

Rezultatai. Rūkantys respondentai statistiškai reikšmingai ($p=0,004$) mažiau nei nerūkantys sutiko su teiginiu, jog cigarečių rūkymas yra žalingas sveikatai (atitinkamai 88% ir 97,5%). Mažiau rūkančiųjų (76%) nei nerūkančiųjų (87,7%) visiškai sutiko su teiginiu, jog elektroninės cigaretės žalingos sveikatai ($p=0,015$), su analogišku teiginiu apie kaitinamąjį tabaką visiškai sutiko 70% rūkančių ir 85,2% nerūkančių ($p=0,006$). Lyginant elektroninių cigarečių ir kaitinamojo tabako žalą sveikatai su įprastomis cigaretėmis, daugiau respondentų kaip mažiau žalingą įvertino kaitinamąjį tabaką (47,6%) nei elektronines cigaretes (39,1%). Rūkančių ir nerūkančių gydytojų nuomonės vertinant reliatyvią gaminių riziką skyrėsi statistiškai nereikšmingai.

Išvados. Dauguma šeimos gydytojų vertina cigaretes, elektronines cigaretes ir kaitinamojo tabako gaminius kaip žalingus sveikatai, tačiau rūkantys gydytojai šių gaminių absoliučią riziką vertina kaip mažesnę nei nerūkantys gydytojai. Gydytojai kaitinamojo tabako gaminius vertina palankiau nei elektronines cigaretes. **Raktažodžiai.** Rūkymas; elektroninės cigaretės; kaitinamasis tabakas; šeimos gydytojai.